Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-ACTINE (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-actine dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur système THERALIS-TECAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8h - T. ambiante	J+7	1468	70	/	/
Ac. ANTI-ARN POLYMERASE III	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-ARN polymérase III dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	NON	NON	NON	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINES 1 (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-ß2 glycoprotéines 1 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-BETA 2 GLYCOPROTEINES 1 (IgM)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-ß2 glycoprotéines 1 d'isotype IgM dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-CARDIOLIPINES (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-cardiolipides IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-CARDIOLIPINES (IgM)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-cardiolipides IgM dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-CELLULES PARIETALES DE L' ESTOMAC (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage d'Ac. anti-cellules pariétales de l'estomac dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1490	40	/	/
Ac. ANTI-CELLULES PARIETALES DE L'ESTOMAC (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Identification d'Ac. anti-cellules pariétales de l'estomac dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-CENTROMERES (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage de la concentration d'Ac. anti-centromères dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte automatisée sur système AFT 320 SX - IMAGE NAVIGATOR	1	Tube sec (rouge)	5/7 du lundi au vendredi	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J0 à J7	1453	39	/	/
Ac. ANTI-CENTROMERES (IgG) - Technique de confirmation N°1	Auto-Immunité	Identification et détermination de la concentration d'Ac. anti-centromères (CENP-B) dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-CENTROMERES (IgG) - Technique de confirmation N°2	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-centromères (CENP-A et CENP-B) dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES (IgG) ANCA	Auto-Immunité	Recherche et titrage d'ANCA d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	3 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+3	1462	40	/	/
Ac. ANTI-DFS70 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-DFS70 (Dense Fine Speckles) dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-DNA (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-DNA double brin dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1455	68	/	/
Ac. ANTI-EJ (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-EJ (Glycyl-tARN synthétase) dans le sang;	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g022	18.90 euros
Ac. ANTI-ENA (IgG)	Auto-Immunité	Identification des Ac. anti-ENA (Extract Nuclear Antigen) suivants dans le sang : SSa, SSb, JO1, Scl70, Sm, Sm-RNP, RNP, TRIM 21.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	68	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-ENDOMYSIUM (IgA)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac. anti-Endomysium d'isotype IgA dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1830	40	/	/
Ac. ANTI-FACTEUR II (IgG) (Ac. anti-prothrombine)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-Facteur II (ou prothrombine) IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-FACTEUR II (IgM) (Ac. anti-prothrombine)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'AC anti-Facteur II (ou prothrombine) IgM dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24h - T. ambiante	J+7	1460	67	/	/
Ac. ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Facteur Intrinsèque dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1491	70	/	/
Ac. ANTI-FACTEUR RHUMATOIDE SPECIFICITE HUMAINE (IgM) (ancien LATEX)	Auto-Immunité	Détermination dans le sang de la concentration d'Ac anti-FR de classe IgM dirigés contre les déterminants Fc d'immunoglobuline G humaine.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie (Automate Cobas Roche)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - T. ambiante	J+7	1452	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Ac. ANTI-FIBRILLARINE	Auto-Immunité	Identification d'Ac. anti-Fibrillarine dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-GLIADINE DEAMIDEE (IgA)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Gliadine désamidée (ou déamidée) IgA dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-GLIADINE DEAMIDEE (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac.anti-Gliadine désamidée (ou déamidée) IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-GP210 (IgG)	Auto-Immunité	Détection des auto-anticorps d'isotype IgG dirigés contre l'antigène GP210 (aspect de type anti-membrane nucléaire en immunofluorescence indirecte).	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1473	70	/	/
Ac. ANTI-HISTONES (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Histones dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1459	70	/	/
Ac. ANTI-Jo1 (IgG) (histydil-ARNt synthétase)	Auto-Immunité	Identification et détermination de la concentration d'Ac. anti-Jo1 dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-Jo1 (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Recherche et identification d'AC anti-Jo1 (histidyl - ARNt synthétase) dans le sang d'isotype IgG.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1456	68	/	/
Ac. ANTI-KU (IgG)	Auto-Immunité	Identification d'Ac.anti-KU dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-LC1 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage d'Ac.anti-LC1 (Ac. anti-Liver Cytosol) d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1465	80	/	/
Ac. ANTI-LC1 (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Identification des Ac. anti-LC1 d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g035	18.90 euros
Ac. ANTI-LKM1 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage d'AC anti-LKM1 (Liver Kidney Microsomes) d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1465	80	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-LKM1 (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Identification d'Ac. anti-LKM1 (anti-Liver Kidney Microsomes) d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g035	18.90 euros
Ac. ANTI-MDA5 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-MDA5 d'isotype IgG dans le sang (Melanoma Differentiation Associated protein 5)	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-MEMBRANE BASALE DERMO-EPIDERMIQUE (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac. anti-membrane basale dermo-épidermique d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl	8H - Température ambiante	J+7	1493	40	/	/
Ac. ANTI-MEMBRANE BASALE GLOMERULAIRE (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. Anti-Membrane basale glomérulaire d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1497	70	/	/
Ac. ANTI-MI2 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'AC anti-Mi2 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-MITOCHONDRIES de type II (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac. anti-mitochondries de type II d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1465	80	/	/
Ac. ANTI-MITOCHONDRIES de type II (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Identification des Ac. anti-MITOCHONDRIES de type II d'isotype IgG dans le sang. M2/native PDC M2/OGDC-E2 M2/BCOADC-E2 M2/PDC-E2	Auto-Immunité	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	SANG (SERUM)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1471	180	/	/
Ac. ANTI-MUSCLE LISSE (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac. anti-muscle lisse d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1 à 2 séries par semaine	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1465	80	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-MYELOPEROXYDASE (IgG) (MPO)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. Anti-MYELOPEROXYDASE d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/3	Non	Non	Non	500 µl sérum	24H - Température ambiante	J+3	1463	70	/	/
Ac. ANTI-NOR-90 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-Nor-90 d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-NUCLEAIRES (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des anticorps antinucléaires d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte automatisée sur système AFT 320 SX - IMAGE NAVIGATOR	1	Tube sec (rouge)	5/7 du lundi au vendredi	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - T° ambiante	J+4	1453	39	/	/
Ac. ANTI-NUCLEOSOMES (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Nucléosomes d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g015	18.90 euros
Ac. ANTI-NXP2	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-NXP2 d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-OJ (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-OJ (isoleucyl-ARNt synthétase) d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g022	18.90 euros
Ac. ANTI-PCNA (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	/	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES (IgG) (CCP)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Anticorps anti-peptides cyclique citrullinés dans le sang pour le diagnostic et le pronostic de la Polyarthrite Rhumatoïde.	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - T. ambiante	J+7	1827	57	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-PL12 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac.anti-PL12 (alanyl-ARNt synthétase) d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g022	18.90 euros
Ac. ANTI-PL7 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'AC anti-PL7 (thréonyl-ARNt synthétase) d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g022	18.90 euros
Ac. ANTI-PMSCL (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-PMSCL d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1456	40	/	/
Ac. ANTI-PMSCL (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-PMSCL 75 et PMSCL 100 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1456	40	/	/
Ac. ANTI-PROTEINASE 3 (IgG) (PR3)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-PR3 d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/3	Non	Non	Non	500 µl sérum	24H - Température ambiante	J+3	1463	70	/	/
Ac. ANTI-RETICULINE (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac anti-réticuline d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - T. ambiante	J+7	/	/	/	/
Ac. ANTI-RIBOSOMES (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des Ac. anti-ribosomes d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte automatisée sur système AFT 320 SX - IMAGE NAVIGATOR	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-RIBOSOMES (IgG) - Technique de confirmation	Auto-Immunité	Identification et détermination de la concentration d'Ac. anti-Ribosomes d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	/	/	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-SAE1 et ANTI-SAE2 (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-SAE1 - SAE2 (Small ubiquitin-like modifier Activating Enzyme) d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-Scl70 (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Scl70 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-Scl70 (IgG) - Technique de confirmation N°1	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-SCL70 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1456	40	/	/
Ac. ANTI-SLA (IgG)	Auto-Immunité	Détection des auto-anticorps d'isotype IgG dirigés contre les antigènes SLA (antigènes solubles du foie).	sang (sérum)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G036	70
Ac. ANTI-Sm (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Sm d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-SM-RNP (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-Sm/RNP d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-SP100 (IgG)	Auto-Immunité	Détection des auto-anticorps d'isotype IgG dirigés contre l'antigène SP100 (aspect de type dot nucléaire en immunofluorescence indirecte).	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g035	18.90 euros
Ac. ANTI-SRP (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-SRP (Signal Recognition Particle) d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	g022	18.90 euros

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-SSa 60 (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-SSa 60 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-SSb (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. Anti-SSb d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-SUBSTANCE INTERCELLULAIRE (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et titrage des AC. anti-substance inter-cellulaire d'isotype IgG dans le sang.	SANG (SERUM)	Méthode d'immunofluorescence indirecte manuelle sur microscope à fluorescence.	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	500 µl	8H - Température ambiante	J+7	1494	40	/	/
Ac. ANTI-TH-TO (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-Th/To d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-THYROGLOBULINE (IgG) (TG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac anti-thyroglobuline d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - T. ambiante	J+7	1484	55	/	/
Ac. ANTI-THYROPEROXYDASE (IgG) (TPO)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. Anti-thyroperoxydase d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - T. ambiante	J+7	1487	60	/	/
Ac. ANTI-TIF1 GAMMA (IgG)	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-TIF1-γ (Transcriptional Intermediary Factor 1) d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-TRANSGLUTAMINASE TISSULAIRE (IgA)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac.anti-tranglutaminase d'isotype IgA dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1828	58	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Ac. ANTI-TRANSGLUTAMINASE TISSULAIRE (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. Anti-transglutaminase d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1829	60	/	/
Ac. ANTI-TRIM 21 (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac. anti-TRIM 21(anciens Ac. anti-SSa 52) d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-TRIM 21 (IgG) - Technique de confirmation N°1	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. Anti-TRIM 21 d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	/	/	G018	18.90 euros
Ac. ANTI-U1 RNP (IgG)	Auto-Immunité	Détermination de la concentration d'Ac.anti-U1 RNP d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée quantitative par immunofluorimétrie (technologie Luminex)	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	600 µl sérum	24H - Température ambiante	J+7	1457	70	/	/
Ac. ANTI-U1RNP (IgG) - Technique de confirmation N°1	Auto-Immunité	Recherche et identification d'Ac. anti-U1 RNP d'isotype IgG dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode automatisée par Immunodot sur système BLUE DIVER - BLUESCAN	1	Tube sec (rouge)	1/7	Non	Non	Non	200 µl sérum	8H - Température ambiante	J+7	1456	40	/	/
Acanthocytes (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification d'acanthocytes	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscope optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Acétonurie	Biochimie générale et spécialisée	Recherche de la présence d'acétone dans les urines	URINES	Keto-Diabur test 5000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0620	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Acide lactique (Lactacidémie/Lactates)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Acide lactique dans le sang	SANG	Enzymatique colorimétrique C8000 Roche	1	Tube fluoré (gris)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h	J0	0530	20	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Acide urique (Uricémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'acide urique dans le sang	SANG	Uricase C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0532	6	/	/
Acide urique Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'acide urique dans le liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Uricase C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0532	6	/	/
Acide urique urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'acide urique dans un échantillon d'urines	URINES	Uricase C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0622	7	/	/
ACTH (Corticotropine)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'ACTH (Corticotropine) dans le sang	SANG	ECL/sandwich E 8000 Roche	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h	J0	7420	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Adalimumabémie	Pharmacologie - Toxicologie	Détermination de la concentration d'ADALIMUMAB dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (bouchon rouge)	Toutes les 8 semaines	OUI	OUI (Joindre la fiche spécifique de renseignements cliniques)	Remplir correctement le tube	2 ml de sérum	48H à T° ambiante	≤ 8 SEMAINES	/	/	M053 (Liste complémentaire)	27 euros
Adénogramme	Hématocytologie	Examen cytologique : frottis d'appositions de ponction ganglionnaire	GANGLION	Méthode manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif. Identification morphologique et numération sur frottis après coloration par microscopie optique	2 à 3 frottis d'appositions	Aiguille à ponction / Lames	5/7 du lundi au vendredi	Siège du ganglion	Oui	Non	Etalement de 2-3 frottis et fixation par séchage à l'air	T. ambiante ; délai d'acheminement < 24H après étalement	J0 à J+3	1101	250	/	/
ALAT et ASAT (Transaminases GPT et GOT)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique de l'ALAT et ASAT dans le sang	SANG	IFCC avec PP C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0522	9	/	/
Albumine LCR	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'albumine dans le LCR	LCR	Immunoturbidimétrie C8000 Roche	/	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1614	35	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Albumine Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'albumine dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Vert de bromocrésol C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1633	35	/	/
Albumine sanguine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'albumine dans le sang	SANG	Vert de bromocrésol C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1806	6	/	/
Albumine urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'albumine dans un échantillon d'urines	URINES	Immunoturbidimétrie C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1133	14	/	/
Alcoolémie	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'alcool dans le sang	SANG	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0534	30	/	/
Alpha Foeto Protéine (AFP)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Alpha Foeto Protéine (AFP) dans le sang	SANG	ECL/sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0320	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Alpha-1-antitrypsine (AAT)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de l'α1 antitrypsine dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	2/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J4	1807	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
AMH (Hormone anti-mullerienne)	Biochimie générale et spécialisée	Dosage de l'AMH dans le sang.	SANG	ECL/sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	2 fois par semaine	Non	Non	Non	/	4H - T° ambiante	analyse réalisée le mardi et le vendredi	/	123	/	/
Amibes	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification spécifique d'amibes	Selles	Examen direct microscopique	N/A	Pot stérile sec	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 3h T°ambiante	< 12 H	259	B50	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
AMIKACINE Pic plasmatique	Pharmacologie - Toxicologie	Détermination de la concentration maximale de l'amikacine dans le sang, 30 minutes après la fin de la perfusion.	SANG	Immuno turbidimétrie C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Le pic plasmatique (Cmax) évalue l'efficacité (atteinte des objectifs Pk/Pd) et la concentration résiduelle (Cmin) est prédictive de la toxicité. Le dosage plasmatique ne doit	30 min après la fin de la perfusion	Non	4h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
AMIKACINE Taux résiduel	Pharmacologie - Toxicologie	Détermination de la concentration résiduelle d'amikacine dans le sang.	SANG (PLASMA)	Immuno turbidimétrie C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	La concentration résiduelle est prédictive de la toxicité du traitement. Un dosage de la concentration résiduelle est nécessaire	Taux résiduel avant injection suivante	Non	4h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
Ammoniémie sanguine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'ammonium (NH3) dans le sang	SANG	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Tube parfaitement rempli à transporter immédiatement au laboratoire sur de la glace	Non	<1h - Dans la glace	J0	0536	40	/	/
Amylase Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique de l'amylase dans lun liquide de pontion	LIQUIDE DE PONCTION	IFCC Ethylidene-G7-PNP C8000 roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1511	7	/	/
Amylase urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique de l'amylase dans un échantillon d'urines	URINES	IFCC Ethylidene-G7-PNP C8000 roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1511	7	/	/
Amylasémie	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique de l'amylase dans le sang	SANG	IFCC Ethylidene-G7-PNP C8000 roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1510	6	/	/
Antibiogramme bactérie aérobie	Bactériologie	Antibiogramme	Souche bactérienne	Culture sur milieux solides / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Colonies	6/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	NA	< 10j	269	B40	/	/
Antibiogramme bactérie anaérobie	Bactériologie	Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antibiotiques	Souche bactérienne	Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotique(s) après incubation: méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé (ensemencement manuel et lecture automatisée SIRSCAN)	N/A	Colonies	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	NA	< 10J	270	B60	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Anticoagulant circulant (Recherche d'ACC)	Hémostase	Recherche d'un anticoagulant circulant (ACC)	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	/	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / respect de l'ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H à température ambiante	J0	0182	20	/	/
Anticorps anti-Adalimumab	Biochimie générale et spécialisée	Recherche d'anticorps anti-Adalimumab dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (bouchon rouge)	Toutes les 8 semaines	OUI	OUI (Joindre la fiche spécifique de renseignements cliniques)	Remplir correctement le tube	2 ml de sérum	48H à T° ambiante	≤ 8 SEMAINES	/	/	K147 (RIHN)	40,50 euros
Anticorps anti-Infliximab	Biochimie générale et spécialisée	Recherche d'anticorps anti-Infliximab dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (bouchon rouge)	Toutes les 8 semaines	OUI	OUI (Joindre la fiche spécifique de renseignements cliniques)	Remplir correctement le tube	2 ml de sérum	48H à T° ambiante	≤ 8 SEMAINES	/	/	K147 (RIHN)	40,50 euros
Antifongigramme	Parasitologie-Mycologie	Levures : Antifongigramme Filamenteux :envoi de la souche dans un laboratoire extérieur	Souche mycologique	Antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé	N/A	boite de Petri	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	<12h T°ambiante <24h 2-8°C	< 15j	5280 *2	B50 + B50	/	/
Antigène Carcino Embryonnaire (ACE)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Antigène Carcino Embryonnaire (ACE) dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7327	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Antigène Carcino Embryonnaire (ACE) sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Antigène Carcino Embryonnaire (ACE) dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	80	K105
Antigène urinaire légionelle Lp 1	Bactériologie	Recherche d'antigène urinaire bactérien de Legionella pneumophila sérogroupe 1	URINE	Test immunochromatographique	N/A	Tube boraté (vert kaki) ou Pot stérile	7/7	/	Non	Cf manuel de prélèvement	Cf manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 24 H	5235	B90	/	/
Antithrombine	Hémostase	Détermination de la concentration d'Antithrombine dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par colorimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7 si dans le cadre d'une recherche de SN - 1/14J si dans le cadre d'un bilan de thrombophilie	Thrombose, Thrombophilie, CIVD, Syndrome Néphrotique (SN) .	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0 si dans le cadre d'une recherche de SN - J0 à J14 si dans le cadre d'un bilan de thrombophilie	0189	40	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
ASAT (Transaminases GOT)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique de l'ASAT dans le sang	SANG	IFCC avec PP C8000 Roche	1	Tube Hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0517	6	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	Broncho-pulmonaire non protégé	Coloration de Ziehl et microscopie optique	2	Pot stérile sec	5J/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	Broncho-pulmonaire protégé	Coloration de Ziehl et microscopie optique	2	Pot stérile sec	5J/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	Liquide de ponction	Coloration de Ziehl et microscopie optique	2	Pot stérile sec	5J/7	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	Plaie-Ecoulement	Coloration de Ziehl et microscopie optique	2	Pot stérile sec	5J/7	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	URINE	Coloration de Ziehl et microscopie optique	2	Pot stérile sec	5J/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
BAAR	Bactériologie	Recherche de Mycobactérie à l'examen direct (culture envoyée sur un laboratoire extérieur)	Pus - Ponction	Coloration de Ziehl et microscopie optique	N/A	Pot stérile sec	5J/7	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h T° ambiante	< 4j	240	B30	/	/
Bactéries anaérobies	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries anaérobies / Antibiogramme si nécessaire.	ORL	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 20J	215	B80	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Bactéries anaérobies	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries anaérobies / Antibiogramme si nécessaire.	Plaie-Ecoulement	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 20j	215	B80	/	/
Bacteriologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Périphérique nouveau né	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	pot stérile	7/7	Types et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 7j	5225	B150	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Appareillage	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	KT: 5cm de l'extrémité distale	< 2h T°ambiante	< 7J	5216	B150	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Cathéter-prothèse	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 7J	5216	B150	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Cutané-phanère	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	5214	B110	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Fragments organiques	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30J	5215	B120	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Œil	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 30j	5213	B100	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	ORL	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7J	5209	B100	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Périphérique nouveau né	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7J	5225	B150	/	/
Bactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Plaie-Ecoulement	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	5215	B120	/	/
Beta-2 microglobuline	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Béta 2 microglobuline dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie latex C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0324	30	/	/
BHRe (Carbapènémase)	Bactériologie	Recherche de BHRe : Bactérie Hautement Résistante émergente	Ecouvillon rectal	Recherche d'un gène de résistance aux carbapénèmes par biologie moléculaire (GENEXPERT)	1	1 écouvilon avec milieu de transport	7j/7	/	Non	Non	/	< 48h	< 4j	N131	135	/	/
Bicarbonates (CO2 total)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination des bicarbonates dans le sang	SANG	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0571	6	/	/
Bilharziose urinaire	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de Schistosoma haematobium	Urine	Examen direct microscopique	1	Pot stérile uniquement	7/7	Hématurie	Oui	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24H 2-8°C	< 72H	266	B25	/	/
Bilirubine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en bilirubine totale, des fractions libres et conjuguées, dans le sang	SANG	Méthode Diazo C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Protéger le tube de la lumière après prélèvement	1 ml	4h - T. ambiante. Protéger le tube de la lumière	J0	1601	7	/	/
Bilirubine libre (Indirecte)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en bilirubine libre dans le sang	SANG	Méthode Diazo C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Protéger le tube de la lumière après prélèvement	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Bilirubine Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en bilirubine totale dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Méthode Diazo C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	20	L135
Birirubine conjuguée (Directe)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en bilirubine conjuguée dans le sang	SANG	Méthode Diazo C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Protéger le tube de la lumière après prélèvement.	Non	4h - T. ambiante. Protéger le tube de lumière.	J0	/	/	/	/
BOM (frottis d'appositions)	Hématocytologie	Examen cytologique : frottis d'appositions de Biopsie Ostéo Médullaire	MOELLE	Méthode manuelle de type qualitatif et quantitatif. Identification morphologique et numération sur frottis après coloration par microscopie optique	1 à 2 frottis d'apposition	Trocart de Jamshidi à usage unique / Seringue / Lames	5/7 du lundi au vendredi	Oui	Oui	Non	Etalement de 1-2 frottis et fixation par séchage à l'air	T. ambiante ; délai d'acheminement < 24H après étalement	J0 à J+3	1101	250	/	/
CA 19-9 liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de CA 19-9 dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	80	K103
CA 19-9 sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de CA 19-9 dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7323	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Calcium (Calcémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en calcium dans le sang	SANG	NM-BAPTA C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0578	6	/	/
Calcium ionisé	Biochimie générale et spécialisée	Dosage de la fraction de active du calcium sanguin.	SANG TOTAL	Electrodes spécifiques. Analyseur RP 500 Siemens	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	En cas de troubles acido-basique, un dosage du calcium ionisé associé à la détermination du pH sanguin est indiqué par prélèvement d'une seringue à gazométrie (voir	/	1 ml	Acheminement IMMEDIAT	1h	0578	6	/	/
Calciurie (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en calcium dans un échantillon d'urine	URINES	NM-BAPTA C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0624	6	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Carboxyhémoglobine (HbCO)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pourcentage de carboxyhémoglobine le sang	SANG TOTAL	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Seringue gazométrie	7/7	Non	Non	Non	Non	<30 min - T. ambiante	J0	1680	35	/	/
Cellules anormales (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et / ou quantification de cellules anormales	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	du lundi au samedi matin	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Cellules anormales sur LCR (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de cellules anormales dans le LCR	LCR	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube sec stérile (beige)	5/7 du lundi au vendredi	Non	Non	Non	Non	<24h - T. ambiante	J0 à J+3	/	/	E200	27 euros
Cellules anormales sur Liquide de ponction (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de cellules anormales dans liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube citrate (bleu) ou Tube EDTA (mauve) ou Pot stérile	5/7 du lundi au vendredi	Non	Non	Non	Non	<24h - T. ambiante	J0 à J+3	/	/	E200	27 euros
Cellules de Sezary (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de Cellules de Sézary	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscope optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Céruléoplasmine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en céruléoplasmine dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	2/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J4	1809	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Chaines libres sériques KAPPA	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en chaînes libres légères libres de type kappa dans le sang.	SANG (SERUM)	Immuno néphélémétrique Optilite Bindind Site	1	Tube gel (jaune)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	75	K052
Chaines libres sériques LAMBDA	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en chaînes libres légères libres de type kappa dans le sang.	SANG (SERUM)	Immuno néphélémétrique Optilite Bindind Site	1	Tube gel (jaune)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	75	K051

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Champignon filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Broncho-pulmonaire protégé	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253	B70	/	/
Champignons dermatophytes	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de Dermatophytes et apparentés aux Dermatophytes.	Cutané-phanère	Examen direct Mise en culture sur milieu spécifique / identification morphologique macroscopique et microscopique	N/A	Pot stérile sec ou écouvillon sec	L.M.Me.J.V	/	/	Cf Manuel de prélèvement	/	< 3j	< 45J	253 + 280	B70 + B50	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Fragments organiques	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Pot stérile sec	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253	B70	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Liquide de ponction	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253	B70	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Oculaire	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15j	253	B70	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	ORL	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 15J	253	B70	/	/
Champignons Filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Placenta Locchies	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Pot sec stérile	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15j	253	B70	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Plaie-Ecoulement	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 15J	253	B70	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Broncho-pulmonaire non protégé	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15j	253	B70	/	/
Champignons filamenteux	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification au genre. (envoi de la souche dans un laboratoire extérieur pour identification à l'espèce et antifongigramme)	Pus - Ponction	Mise en culture sur milieu spécifique	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15j	253	B70	/	/
Chlamydia Pneumoniae (Sérologie sanguine)	Sérologie infectieuse	Détection d'anticorps anti-chlamydiae pneumoniae IgG et IgM dans le sang	SANG (SERUM)	Chimiluminescence VIRCLIA	1	Tube sec (rouge)	2/7	Infection pulmonaire	Non	Non	Non	8h - T. ambiante	J+7	1308	60	/	/
Chlamydiae trachomatis (Sérologie sanguine)	Sérologie infectieuse	Détection d'anticorps anti-chlamydiae pneumoniae IgG et IgM dans le sang	SANG (SERUM)	Chimiluminescence VIRCLIA	1	Tube sec (rouge)	2/7	Infection génitale	Non	Non	Non	8h - T. ambiante	J+7	1307	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Bactériologie	Recherche spécifique de C.trachomatis et N.gonorrhoeae	URINE	Biologie moléculaire	1	Pot stérile 1er jet urinaire	7/7	/	Non	Cf manuel de prélèvement	Cf manuel de prélèvement	< 24H T°ambiante	< 7J	5301	B85	/	/
Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Bactériologie	Recherche spécifique de C.trachomatis et N.gonorrhoeae	Génital femme	Biologie moléculaire	/	1 écouvillon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf manuel de prélèvement	Cf manuel de prélèvement	< 24h T°ambiante	< 7j	5301	85	/	/
Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Bactériologie	Recherche spécifique de C.trachomatis et N.gonorrhoeae	Ecouvillon rectal	Biologie moléculaire	1	1 écouvillon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf manuel de prélèvement	Cf manuel de prélèvement	< 24h T°ambiante	< 7j	5301	85	/	/
Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae	Bactériologie	Recherche spécifique de C.trachomatis et N.gonorrhoeae	ORL	Biologie moléculaire	/	1 écouvillon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf manuel de prélèvement	Cf manuel de prélèvement	< 24h T°ambiante	< 7j	5301	85	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Chlore	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de chlore dans le sang.	SANG	ISE Indirect C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L119
Chlore sur LCR	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de chlore dans le LCR	LCR	ISE indirect C8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L119
Chlore sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de chlore dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ISE indirect C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L119
Chlore Urinaire (Dosage - Tx/24h)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en chlore sur recueil d'urines de 24h	URINES	ISE indirect C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Volume Urines des 24h	4h - T. ambiante	J0	/	/	5	L119
Chlore Urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en chlore dans urines	URINES	ISE indirect C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L119
Cholestérol HDL	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de HDL Cholestérol dans le sang	SANG	Enzymatique, colorimétrique PAP C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	A jeûn	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	30	L019
Cholestérol LDL (Dosage)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de LDL Cholestérol dans le sang	SANG	Enzymatique, colorimétrique (CHOD/PAP) C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	A jeûn	Non	4h - T. ambiante	J0	2001	25	/	/
Cholestérol total	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Cholestérol Total dans le sang	SANG	Enzymatique, colorimétrique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	A jeûn	Non	4h - T. ambiante	J0	0580	5	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Cholestérol total sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Cholestérol dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Enzymatique, colorimétrique C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	5	L110
Clairance à la créatinine avec formule de Cockroft et Gault	Biochimie générale et spécialisée	Débit de filtration glomérulaire par détermination de la créatinine sanguine et calcul par application d'une équation intégrée selon Cockroft et Gault	SANG	Calcul par la formule de Cockroft et Gault. C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	POIDS du patient	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/
Clairance à la créatinine endogène	Biochimie générale et spécialisée	Capacité du rein à éliminer totalement la créatinine d'un volume donné de plasma sanguin par unité de temps	SANG + URINES	Calcul C8000 Roche	2	Pot non stérile + Tube hépariné (vert)	7/7	POIDS + TAILLE du patient	Non	Non	Volume Urines des 24h	4h - T. ambiante	J0	0407	30	/	/
Clairance au Phosphore	Biochimie générale et spécialisée	Capacité du rein à éliminer totalement le phosphore d'un volume donné de plasma sanguin par unité de temps	SANG + URINES	Calcul C8000 Roche	2	Pot non stérile + Tube hépariné (vert)	7/7	POIDS + TAILLE du patient	Non	Non	Volume Urines des 24h	4h - T. ambiante	J0	0629	15	/	/
Clairance de l'Urée	Biochimie générale et spécialisée	Capacité du rein à éliminer totalement l'urée d'un volume donné de plasma sanguin par unité de temps	SANG + URINES	Calcul C8000 Roche	2	Pot non stérile + Tube hépariné (vert)	7/7	POIDS + TAILLE du patient	Non	Non	Volume Urines des 24h	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/
Clostridium difficile (toxine)	Bactériologie	Recherche spécifique de Clostridium difficile toxinogène	Selles	Recherche d'antigène et de toxines A/B de Clostridium difficile : méthode immunoenzymatique. En cas d'antigène + et de toxines - ajout d'un test de biologie moléculaire pour recherche de toxineB, binaire et gène O27.	N/A	Pot stérile	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 24h	< 24h	5292 (antigène négatif) ou 1033 +/- N131 (recherche O27)	B60 (antigène négatif) ou B85 +/- 135eur (recherche	/	/
Clostridium perfringens	Bactériologie	Recherche spécifique de Clostridium perfringens Antibiogramme en cas de positivité	Selles	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	/	Pot stérile	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	<4h T°ambiante	< 10J	215	B80	/	/
CMV (Sérologie) Ig.G + IgM	Sérologie infectieuse	Sérologie CMV IgG +IgM	SANG (SERUM)	IgG : ECL / Sandwich E8000 Roche IgM : ECL / µ-Capture E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1260	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Colonisation nasale SARM	Bactériologie	Recherche de Staphylococcus aureus résistant à la Méthicilline	ORL	Culture sur milieux solides spécifiques / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	/	1 écouvilon avec milieu de transport	7j/7	/	non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	214	B60	/	/
Coloration de PERLS	Hématocytologie	Coloration de Perls par coloration cytochimique	MOELLE	Identification morphologique et quantification d'hémosidérine dans les érythroblastes, macrophages et globules rouges par microscopie optique après coloration de Perls (technique de coloration externalisée au CHU Conception)	1 frottis d'apposition	Trocart de Mallarmé à usage unique / Seringue / Lames	5/7 du lundi au vendredi	Oui	Oui	Non	Non	T. ambiante	de J+3 à J +15	1102	25	/	/
Congélation de sperme	Embryologie clinique	Cryobiologie	Spermatozoïdes	Technique manuelle de préparation et de congélation des paillettes de sperme en cours d'AMP ou en vue d'autoconservation.	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0065 / 0067	350	/	/
Congélation d'embryons	Embryologie clinique	Cryobiologie	embryons	Technique manuelle de préparation des paillettes de congélation des embryons en azote liquide	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0054	1150	/	/
Coproculture	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries entéro-pathogènes (Salmonelle-Shigelle-Yersinia-Campylobacter- E.coli entero-hémorragique SHU) Antibiogramme si présence.	Selles	Biologie moléculaire et Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	<24h T°ambiante - 5J 2-8°C	< 7J	5207	B180	/	/
Corps de Heinz (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de corps de Heinz	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0	1110	20	/	/
Cortisol plasmatique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Cortisol dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Heure de prélèvement	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0462	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
C-peptide	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de C-peptide dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1137	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Créatine kinase (CK)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique CK dans le sang	SANG	CK NAK IFCC, SFBC C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1520	12	/	/
Créatinine sanguine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en créatinine dans le sang	SANG	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0592	6	/	/
Créatinine sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en créatinine dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L115
Créatinine Urinaire	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en créatinine dans urines	URINES	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0627	6	/	/
Cryoconservation de sperme	Embryologie clinique	Cryobiologie	Paillettes contenant les spermatozoides	Processus de maintien en température du conditionnement de préparation de sperme en paillette et de stockage dans l'azote liquide	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Renouvellement annuel du consentement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0066 / 0068	150	/	/
Cryoconservation d'embryon(s)	Embryologie clinique	Cryobiologie	Embryon	Processus de maintien en température du conditionnement en paillette et de stockage dans l'azote liquide	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Renouvellement annuel du consentement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0064	150	/	/
Cryoconservation d'ovocytes	Embryologie clinique	Cryobiologie	Ovocytes	Processus de maintien en température du conditionnement des ovocytes dans l'azote liquide	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Renouvellement annuel du consentement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0086	150	/	/
Cryptocoques	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification / Antifongigramme si nécessaire	Fragments organiques	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Pot stérile sec	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253 +/- 280	70 +/- 50	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Cryptocoques	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification	Liquide de ponction	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	<15J	253 +/- 280	70 +/- 50	/	/
Cryptocoques	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification	Broncho-pulmonaire non protégé	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253 +/- 280	70 +/- 50	/	/
Cryptocoques	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification	Broncho-pulmonaire protégé	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	253 +/- 280	70 +/- 50	/	/
CTX beta Crosslaps	BIOCHIMIE IMMUNOLOGIE	Dosage des produits de dégradation du collagène de type I dans le sang.	SANG	ECLIA Roche Cobas 8000, méthode sandwich	1	Tube EDTA (mauve)	7j/7	Appréciation de la résorption osseuse	/	Analyse à réaliser le matin sur des sujets à jeun. Pour un suivi à long terme, il est recommandé d'effectuer tous les prélèvements dans les mêmes conditions en raison d'une variabilité	1 ml	8h avant centrifugation	1j	7310	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Score de Hay/Ison Recherche spécifique de Trichomonas vaginalis Recherche et identification spécifique de Streptocoque B et Gonocoque Recherche de Bactéries pathogènes et levures Antibiogramme si nécessaire	Génital femme	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7J	5202	B140	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries (dont Gonocoque) et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Génital Homme	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvillon à embout fin	7/7	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	< 7J	5203	B120	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Cytologie (numération et formule leucocytaire) si nécessaire /Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Liquide de ponction	Cytologie en cellule / Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30J	5231	B200	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Pelvien/fibroscopie	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30j	5204	B220	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Placenta Locchies	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30j	5223	B100	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries / antibiogramme si nécessaire	Broncho-pulmonaire non protégé	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 10j	5210	B150	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Cytologie /Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Broncho-pulmonaire protégé	Compte en cellule/ Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 10j	5230	B200	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Pus - Ponction	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30j	5224	B200	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Sperme	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé. Recherche de Mycoplasmes uro-génitaux.	N/A	Pot stérile sec	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 7j	5205	B90	/	/
Cytobactériologie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries et levures / Antibiogramme et Antifongigramme si nécessaire.	Ulcération oculaire	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	5226	B100	/	/
Cytobactériologie urinaire (ECBU)	Bactériologie	Cytologie urinaire / numération bactérienne / Recherche et identification de bactéries / Antibiogramme si nécessaire.	URINE	Cytologie automatisée ou manuelle / Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Tube boraté (vert kaki) / à défaut pot stérile - 2ieme jet urinaire	7/7	Miction, sondage, Ponction	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	Tube boraté : 48h T°ambiante / Pot stérile : < 2h T°ambiante	< 7 J	5201 (miction) 5215 (sondage)	B63 (miction) B120 (sondage)	/	/
Cytologie	Bactériologie	Cytologie : numération (hématies et leucocytes), formule leucocytaire	Liquide de ponction	Cytologie en cellule / Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme et antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	LCR : tubes sec stérile (beige) ; Liquide articulaire : Tube EDTA ou CITRATE Autres liquides : Tube EDTA.	Numération: 7/7 Formule leucocytaire: L.M.Me.J.V	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 3J	/	/	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Cytologie	Bactériologie	Numération cellulaire (hématies/leucocytes) et formule leucocytaire (LBA)	Broncho-pulmonaire protégé	Compte en cellule, formule sur MGG	N/A	Pot stérile sec	Numération: 7/7 Formule leucocytaire: L.M.Me.J.V	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 3J	/	/	/	/
Cytologie urinaire	Bactériologie	Cytologie urinaire	URINE	Cytologie automatisée ou manuelle	N/A	Tube boraté (vert kaki) / à défaut pot stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	Tube boraté : 48h T°ambiante / Pot stérile : < 2h T°ambiante	< 24 H	0219	B25	/	/
Dacryocytes (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche de dacryocytes	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif/semi-quantitatif par microscopie optique.	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	contexte clinique	Non	Non	> 1 ml	12h - T ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
D-Dimères plasmatiques	Hémostase	Détermination de la concentration de D-Dimères dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Suspicion de thrombose veineuse profonde - CIVD	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0	1022	56	/	/
Demodex follicularum	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de poux de peau	Cutané-phanère	Examen direct macro et/ou microscopique	N/A	Contacter le laboratoire	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Contacter le laboratoire	/	< 12h T°ambiante	< 4J	267+9910	B10+B10	/	/
Densité urinaire	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la densité urinaire	URINES		1	Pot non stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L084
DIGOXINE	Pharmacologie - Toxicologie	Dosage du médicament Digoxine dans le sang	SANG	KIMS C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	/	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0327	70	/	/
Drépanocytes (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de drépanocytes	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
EBV, Epstein Barr Virus (sérologie)	Sérologie infectieuse	Sérologie EBV : EBNA IgG, VCA IgG et IgM	SANG (SERUM)	EBNA IgG : ECL / sandwich E8000 Roche VCA IgG : ECL / sandwich E8000 Roche EBV IgM : ECL / µ-Capture E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Recherche du statut immunitaire EBV, dans les contextes suivants : - la greffe (chez le donneur et le receveur avant greffe), - avant mise sous traitements fortement immunosuppresseurs	Non	Non	Non	8h - T. ambiante	J1	1009	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Electrophorèse de l'Hémoglobine	Biochimie générale et spécialisée	Séparation et caractérisation des différentes fractions de l'hémoglobine en fonction de leur charge électrique et pour des charges identiques en fonction de leur taille	SANG	Electrophorèse capillaire Sebia Capillarys TERA 3	1	Tube EDTA (violet)	2/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J+5	1113	60	/	/
Electrophorèse protéines sériques (Protidogramme)	Biochimie générale et spécialisée	Séparation et détermination de la concentrations des protéines dans le sang	SANG (SERUM)	Sebia Capillarys Electrophorèse capillaire	1	Tube gel (jaune)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J1	0570	50	/	/
Eliquis- Activité anti-Xa (Apixaban)	Hémostase	Détermination de l'activité anti-Xa de l'Eliquis circulant dans le sang.	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par colorimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Surveillance du traitement anticoagulant par ELIQUIS : Hémorragie ou risque hémorragique pré-opératoire	Non	Temps de pose du garrot < 1 min. / Respect de l'ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	2H - T. ambiante	J0	/	/	E 154	16.20 euros
Enrichissement sur flacon aérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries aérobies après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Pus - Ponction	Incubation des flacons d'hémoculture En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Flacon aérobie	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	< 30j	5224	B200	/	/
Enrichissement sur flacon anaérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries aérobies après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Pus - Ponction	Incubation des flacons d'hémoculture En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Flacon anaérobie	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	< 30j	5224	B200	/	/
Estradiol (Homme/Enfant)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Estradiol chez l'homme/chez l'enfant dans le sang	SANG	ECL / Compétition E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0727	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Estradiol (Femme)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Estradiol chez la femme dans le sang	SANG	ECL / Compétition E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Date des dernières règles/ stimulation ovarienne?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0330	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Facteur II (Prothrombine)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur II dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0	1014	25	/	/
Facteur IX (Facteur anti-hémophilique B)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur IX dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	0179	50	/	/
Facteur V (Proaccélérine)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur V dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique/Insuffisance hépatique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0	1015	25	/	/
Facteur VII (Proconvertine)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur VII dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0	1016	25	/	/
Facteur VIII coagulant (Facteur Anti-Hémophilique A)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur VIII dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique/ Thrombophilie	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H - T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	0178	50	/	/
Facteur Willebrand Antigène (vWFAg)	Hémostase	Détermination de la concentration du Facteur Willebrand Antigène dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	6H- T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	1013	40	/	/
Facteur Willebrand Activité (vWF:Act)	Hémostase	Détermination de la concentration du Facteur Willebrand Activité dans le sang.	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase primaire/Syndrome hémorragique/Maladie de Willebrand	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	6H- T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	0192	50	/	/
Facteur X (Facteur Stuart)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur X dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0	1017	25	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Facteur XI (Facteur Rosenthal ou PTA)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur XI dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	48H - T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	0180	50	/	/
Facteur XII (Facteur Hageman)	Hémostase	Détermination de la concentration de Facteur XII dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/allongement du TCA	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4h - T. ambiante	J0 si urgence sinon J0 à J7	0181	40	/	/
Fécondation In Vitro avec Micro-Injection (ICSI)	Embryologie clinique	/	Spermatozoïdes / Ovocytes / Embryons	Technique manuelle incluant l'isolement des ovocytes, la préparation du sperme, la micro-injection sous microscope, la réalisation de la culture embryonnaire et la réalisation du transfert embryonnaire	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Cf. Manuel de prélèvement AMP	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0061	2500	/	/
Fécondation In Vitro classique (FIV)	Embryologie clinique	/	Spermatozoïdes / Ovocytes / Embryons	Technique manuelle incluant l'isolement des ovocytes, la préparation de sperme, la mise en fécondation, la réalisation de la culture embryonnaire et la réalisation du transfert embryonnaire	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Cf. Manuel de prélèvement AMP	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0060	1550	/	/
Fer plasmatique (Sidérémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Fer (Sidérémie) dans le sang	SANG	Ferrozine C8000 ROCHE	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0548	7	/	/
Ferritine plamatique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Ferritine dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1213	21	/	/
Fibrinogène plasmatique (Fibrinémie)	Hémostase	Détermination de la concentration de Fibrinogène dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique/Surveillance des traitements par AVK/Insuffisance hépatique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H à température ambiante	J0	0174	15	/	/
Flacon aérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries aérobies et Levures après enrichissement / Antibiogramme ou antifongigramme en cas de positivité.	Liquide de ponction	Incubation des flacons En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Flacon aérobie	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	<30J	5231	B200	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Flacon anaérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries aérobies après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Liquide de ponction	Incubation des flacons En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	Flacon anaérobie	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	< 30J	5231	B200	/	/
Folates (vitamine B9)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Folates (Vitamine B9) dans le sang	SANG	Roche chimiluminescence	1	Tube hépariné (vert	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1387	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Fraction C3 du Complément	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de la fraction C3 du complément dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	2/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J4	1811	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Fraction C4 du Complément	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentrationde la fraction C3 du complément dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	2/7	Non	Non	Non	/	4h - T. ambiante	J0	1812	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
FSH sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de FSH dans le sang	SANG	ECL E8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	7/7	non	Date des dernières règles	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0473	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Gamma glutamyl transférase (GGT)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique GGT dans le sang	SANG	Enzymatique standardisée IFCC C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0519	5	/	/
Gazométrie Artérielle	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pH, PO2, PCO2, Bicarbonates,RA, saturation O2, HbCO, MethHb dans le sang par prélèvement artériel	SANG TOTAL	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Seringue gazométrie	7/7	Non	FiO2 Température	R1PRE-PF-016-A-PRELPrélèvements artériels / Gazométries (3DSSUH227)	1 ml minimum	1 h - T. ambiante	Immédiat après analyse	0999	75	/	/
Gazométrie artérielle (EBMD)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pH, pCO2, pO2, HCO3-, CO2 total, SaO2, HbCO et MethHb dans le sang artériel.	SANG TOTAL	Electrodes spécifiques. Analyseur RP 500 Siemens	1	Seringue pour gazométrie héparinée	7/7	Non	FiO2 Température	Prélèvements artériels / Gazométries (3DSSUH227)	1 ml minimum	1h - T. ambiante	Immédiat après analyse	0999	75	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Gazométrie Capillaire (EBMD)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pH, PO2, PCO2, Bicarbonates et RA dans le sang par prélèvement capillaire	SANG TOTAL CAPILLAIRE	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Capillaire spécifique gazométrie + bouchons + limaille	Fait à la demande par l'IDE habilité du service	Non	FiO2 Température	Prélèvements artériels / Gazométries (3DSSUH227)	Capillaire rempli intégralement	Doit être réalisé immédiatement après prélèvement	Immédiat, réalisation de l'analyse en service	0999	70	/	/
Gazométrie Veineuse	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pH, PO2, PCO2, Bicarbonates et RA dans le sang par prélèvement veineux	SANG TOTAL	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Seringue gazométrie	7/7	Non	FiO2 Température	Prélèvements artériels / Gazométries (3DSSUH227)	1 ml minimum	1h - T. ambiante	Immédiat après analyse	0999	75	/	/
Gazométrie veineuse (EBMD)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du pH, pCO2, pO2, HCO3-, CO2 total, SaO2, HbCO et MethHb dans le sang veineux.	SANG TOTAL	Electrodes spécifiques. Anayseur RP 500 Siemens	1	Seringue de gazométrie	7/7	Non	FiO2 Température	Prélèvements artériels / Gazométries (3DSSUH227)	1 ml minimum	1h - T. ambiante	Immédiat après analyse	0999	75	/	/
GENTAMYCINE Pic plasmatique	Pharmacologie - Toxicologie	Dosage du médicament Gentamicine dans le sang au pic d'injection (30 minutes après la fin de la perfusion)	SANG	Spectrophotométrie d'absorption KIMS C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Le pic plasmatique (Cmax) évalue l'efficacité (atteinte des objectifs Pk/Pd) et la concentration résiduelle (Cmin) est prédictive de la toxicité. Le dosage	30 minutes après la fin de la perfusion	Non	4h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
GENTAMYCINE Taux résiduel	Pharmacologie - Toxicologie	Dosage résiduel de la Gentamicine dans le sang	SANG	Spectrophotométrie d'absorption KIMS C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	La concentration résiduelle est prédictive de la toxicité du traitement. Un dosage de la concentration résiduelle est nécessaire	Avant la prochaine injection	Non	4h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
GH (Hormone de croissance) sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de GH dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7423	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Glucose dans les urines (Glycosurie) (Dosage - Taux/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Glucose dans les urines	URINES	Hexokinase/G6PDH C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2007	6	/	/
Glucose sang (Glycémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Glucose dans le sang	SANG	Hexokinase/G6PDH C8000 Roche	1	Tube fluoré (gris)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0552	5	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Glucose sur LCR	Biochimie générale et spécialisée	Détermination du taux de Glucose dans le LCR	LCR	Hexokinase/G6PDH C8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0603	10	/	/
Glucose sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Glucose dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Hexokinase/G6PDH C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L111
Haemophylus ducreyi	Bactériologie	Recherche du bacille de Ducreyi agent du chancre mou	Génital Homme	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvillon à embout fin	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	le plus rapidement possible	< 7J	214	B60	/	/
Haptoglobine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Haptoglobine dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1813	20	/	/
HBV - Hépatite B : Anticorps anti-HBc totaux	Sérologie infectieuse	Détection d'Anticorps Anti-HBc totaux dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / Compétition E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0351	55	/	/
HBV - Hépatite B : Anticorps anti-HBs	Sérologie infectieuse	Détermination de la concentration d'Anticorps Anti-HBs dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0323	55	/	/
HBV - Hépatite B : Antigène HBs	Sérologie infectieuse	Détection d'Antigène HBs dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0322	52	/	/
HCG Sous-unités béta libres sériques	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de sous unités béta libres de HCG dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	6/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7317	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
HCG sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Hormone Chorionique Gonadotrophique dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ECL/Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	130	I001
HCG totale	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Hormone Chorionique Gonadotrophique dans le sang	SANG	ECL/Sandwich E8000 Roche	1	Tube Hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7402	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
hCG urinaire	Biochimie générale et spécialisée	Test qualitatif permettant de mettre en évidence la présence d'hCG dans les urines.	Urines	Test qualitatif réalisé sur bandelette interprété par un lecteur optique.	/	Urines	24H/24	Test de grossesse	/	/	200µL	/	10 minutes	7401	25	/	/
HCV - Hépatite C : Anticorps totaux	Sérologie infectieuse	Détection d'Anticorps totaux Anti-HCV dans le sang.	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	3784	47	/	/
Hématies Corps de Jolly (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et ou quantification corps de Jolly	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Hématies à Ponctuations Basophiles (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche d'hématies à ponctuations basophiles	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Hématocrite	Hématocytologie	Détermination de l'hématocrite	SANG TOTAL	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif par techniques d'impédancemétrie, cytométrie de flux, calculs	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0	2108	7	/	/
Hémoculture aérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries aérobies après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Sang	Incubation des flacons d'hémoculture En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	cf manuel de prélèvements	Flacon aérobie	7/7	Recherches spécifiques à préciser : endocartite ou recherche de Listeria	Non	cf manuel de prélèvements	cf manuel de prélèvements	le plus rapidement possible	cas général < 10J / Endocardite < 25J / Listeria < 14J	5219	B80	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Hémoculture anaérobie	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries anaérobies après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Sang	Incubation des flacons d'hémoculture En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	cf manuel de prélèvements	Flacon anaérobie	7/7	Recherches spécifiques à préciser : endocartite ou recherche de Listeria	Non	cf manuel de prélèvements	cf manuel de prélèvements	le plus rapidement possible	cas général < 10J / Endocardite < 25J / Listeria < 14J	5219	B80	/	/
Hémoculture pédiatrique	Bactériologie	Recherche et identification de bactéries après enrichissement / Antibiogramme en cas de positivité.	Sang	Incubation des flacons d'hémoculture En cas de positivité : examen direct / culture sur milieux solides /Identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	cf manuel de prélèvements	Flacon pédiatrique	7/7	/	Non	cf manuel de prélèvements	cf manuel de prélèvements	le plus rapidement possible	< 10J	5219	B80	/	/
Hémoglobine glyquée HbA1C (HBA1C capillaire EBMD)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Hémoglobine A1C dans le sang total par prélèvement capillaire	SANG TOTAL CAPILLAIRE	Abbott Afinion 2	1	Prélèvement capillaire sur support spécifique	Fait à la demande par l'IDE habilitée du service	Non	Non	La ponction capillaire en Pédiatrie (3PED027)	Capillaire rempli (1µL)	Réalisé immédiatement après prélèvement	Immédiat, réalisation de l'analyse en service	1577	20	/	/
Hémoglobine HbA1 C	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Hémoglobine A1C dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie de type TINIA (DCCT/NGSP) C8000 Roche	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1577	20	/	/
Hémogramme (Numération Formule Sanguine)	Hématocytologie	Hémogramme - NFS (Numération-plaquettes-formule et paramètres associés)	SANG TOTAL	Méthode automatisée de type qualitatif et quantitatif par techniques d'impédancemétrie, spectrophotométrie, cytométrie de flux, calculs	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0	1104	20	/	/
Héparinémie : Activite anti-Xa (HBPM / HNF)	Hémostase	Détermination de la concentration d'Héparine circulante par son activité anti-Xa dans le sang chez les patients sous HBPM ou HNF	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par colorimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Surveillance des traitements par HBPM et HNF	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H à température ambiante	J0	0186	30	/	/
HEPATITE B : ADN VIRAL (quantification)	Virologie	Quantification de l'ADN du virus de l'hépatite B dans le sang	SANG (PLASMA)	PCR quantitative sur Genexpert	2	Tube EDTA (mauve)	5/7	Non	Non	/	2 EDTA	24H à température ambiante	< 3J	4120	B140	/	/
HEPATITE C : ARN VIRAL (quantification)	Virologie	Quantification de l'ARN du virus de l'hépatite C dans le sang	SANG (PLASMA)	PCR quantitative sur Genexpert	2	Tube EDTA (mauve)	5/7	Non	Non	/	2 EDTA	24H à température ambiante	< 3J	4124	B200	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
HEV - Hépatite E (Sérologie) IgM	Sérologie infectieuse	Recherche d'IgM anti-hépatite E dans le sang	SANG (SERUM)	CLIA Sandwich Liaison XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	/	4502	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
HIV Western Blot	Sérologie infectieuse	Recherche des différents type d'Anticorps anti-HIV dans le sang par technique d'immunobloting	SANG (SERUM)	Méthode manuelle qualitative immunoenzymatique	1	Tube sec (rouge)	à la demande, en cas de dépistage HIV positif non connu	Sérologie de confirmation du test HIV	Non	Non	Non	3 jours	J+1	0389	180	/	/
HIV-1 : ARN VIRAL (quantification)	Virologie	Quantification de l'ARN du virus HIV-1 dans le sang	SANG (PLASMA)	PCR quantitative sur Genexpert	2	Tube EDTA (mauve)	5/7	Non	Non	/	2 EDTA	24H à température ambiante	< 3J	4122	B175	/	/
HIV1/HIV2 : Anticorps + Antigène P24	Sérologie infectieuse	Détection d'Anticorps Anti-HIV1/HIV2 et d'Antigène P24 dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0388	43	/	/
HOMA Test	Biochimie générale et spécialisée	"Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance" par détermination des taux d'insuline et de glucose sanguin et calcul selon formule mathématique	SANG	Calcul de l'indice selon la formule de HOMA	1	Tube hépariné (vert)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/
Homocystéine plasmatique, HCYS	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Homocystéine dans le sang.	SANG	Enzymatique C8000 Roche	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Transporter au laboratoire immédiatement après prélèvement	1 ml	<1h dans la glace (délai avant centrifugation)	J0	/	/	120	K012
HSV 1 et HSV 2 (Sérologie) IgG	Sérologie infectieuse	Détection d'anticorps d' IgG anti-HSV1 et HSV2	SANG (SERUM)	CLIA Sandwich Liaison XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	J4	1744	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
HTLV-I/II	Sérologie infectieuse	Sérologie HTLVI/II	SANG (SERUM)	ECL/Sandwich Cobas 8000	1	Tube sec (rouge)	7/7	/	/	/	1 ml	7j	1j	1754	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
HVA - Hépatite A : Anticorps IgM	Sérologie infectieuse	Détection d'Anticorps Anti-HVA de classe Ig.M dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / µ-Capture E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0350	70	/	/
HVA -Hépatite A : Anticorps totaux	Sérologie infectieuse	Détection d'Anticorps Anti-HVA totaux (IgG+IgM) dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / Compétition E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1736	49	/	/
Identification bactérie	Bactériologie	Identification de germes bactériens	Souche bactérienne	Détermination phénotypique, après culture par caractérisation biochimique (automatisée VITEK ou manuelle galeries API)	N/A	Colonies	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	/	< 10J	214	B60	/	/
Identification champignon	Parasitologie-Mycologie	Identification	Souche mycologique	Identification par Spectrométrie de masse	N/A	boite de Petri	7/7	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	<12h T°ambiante <24h 2-8°C	< 7j	252	B50	/	/
Identification macroscopique d'un ver	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification macroscopique d'un parasite dans les selles	Selles	Examen direct macroscopique	N/A	Pot stérile sec	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 12h T°ambiante ou < 24 h 2-8°C	< 4J	267 + 9910	B10 + B10	/	/
Immuno électrophorèse des protéines sériques	Biochimie générale et spécialisée	Mise en évidence et caractérisation du type d'une immunoglobuline monoclonale dans le sérum	SANG (SERUM)	Electrophorèse capillaire Sebia Capillarys Tera III	1	Tube gel (jaune)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1571	160	/	/
Immunoglobuline A sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Ig.A dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1814	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Immunoglobuline E Totales	Allergie	Détermination de la concentration d'Ig.E totales dans le sang	SANG	ECL/Sandwich C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1200	40	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	Code BHN	Valeur BHN
Immunoglobuline G sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Ig.G dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1815		/	/
Immunoglobuline M sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Ig.M dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1816		/	/
IMSI	Embryologie clinique	Choix des spermatozoïdes à injecter dans l'ovocyte suite à leur observation à très fort grossissement	Spermatozoïdes	/	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	/	/	C012	950
Infliximabémie	Pharmacologie - Toxicologie	Détermination de la concentration d'INFLIXIMAB dans le sang	SANG (SERUM)	Méthode immunoenzymatique automatisée quantitative sur THERALIS-TECAN	1	Tube sec (bouchon rouge)	Toutes les 8 semaines	OUI	OUI (Joindre la fiche spécifique de renseignements cliniques)	Remplir correctement le tube	2 ml de sérum	48H à T° ambiante	≤ 8 SEMAINES	/	/	M053 (Liste complémentaire)	27 euros
INR	Hémostase	International Normalized Ratio : Mode d'expression du Taux de prothrombine dans la surveillance des traitements par AVK (indépendant de la nature du réactif utilisé dans le dosage)	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Surveillance des traitements par AVK	Non	Temps de pose dugarrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H à température ambiante	J0	0127	20	/	/
Insuline (Insulinémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Insuline dans le sang	SANG	ECL / Sandwich	1	Tube hépariné (vert)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J1	7422		/	/
Ionogramme sanguin (NA+K)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Na+K dans le sang	SANG	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1609	11	/	/
Lactate déshydrogénase (LDH)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique LDH dans le sang	SANG	Enzymatique standardisée IFCC C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0521	6	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Lactate déshydrogénase (LDH) sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique LDH dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Enzymatique standardisée IFCC C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0521	10	/	/
Légionella Pneumophilla	Bactériologie	Recherche spécifique de Légionelles (antibiogramme réalisé par le CNR des Légionelles, sur demande spécifique)	Broncho-pulmonaire protégé	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 15J	214	B60	/	/
Leishmanies dans la moëlle (recherche)	Hématocytologie	Examen cytologique : frottis d'appositions d'aspiration médullaire (examen direct)	MOELLE	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscope optique	3 à 8 frottis d'appositions	Trocart de Mallarmé à usage unique / Seringue / Lames	5/7 du lundi au vendredi	Oui	Oui	Non	Etalement de 3-8 frottis et fixation par séchage à l'air	T. ambiante	J0 à J+3	1126	100	/	/
Levures	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification / Antifongigramme si nécessaire	Cathéter-prothèse-Appareillage	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse / antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé	N/A	Pot stérile sec	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	252	B50	/	/
Levures	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification / Antifongigramme si nécessaire	ORL	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse / antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé	1	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 15J	252	B50	/	/
Levures	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification / Antifongigramme si nécessaire	Broncho-pulmonaire non protégé	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse / antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé	N/A	Pot sec stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 2h T°ambiante	< 15J	252	B50	/	/
Levures	Parasitologie-Mycologie	Recherche, Identification / Antifongigramme si nécessaire	Cutané-phanère	Mise en culture sur milieu spécifique / identification par Spectrométrie de masse / antifongigramme par diffusion sur milieu gélosé	/	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	252	B50	/	/
LH sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de LH dans le sang.	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Date des dernières règles/ stimulation ovarienne?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0472	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Lipase plasmatique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique Lipase dans le sang	SANG	Colorimétrique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0524	6	/	/
Lipase sur liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique Lipase dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Colorimétrique C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	70	J015
Lipoprotéine a	Biochimie générale et spécialisée	Dosage sérique de la lipoprotéine a	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 ROCHE	1	Tube gel (jaune)	2/7	La concentration en Lp(a) étant génétiquement déterminée et très constante pour un individu donné, elle doit être mesurée une fois dans les situations suivantes: sujets à	/	/	1 ml	4h - T°C ambiante	1 semaine	/	/	L236	voir https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/in
Lupus anticoagulant (Recherche)	Hémostase	Recherche et identification d'un inhibiteur de type lupique (=Antiphospholipides)	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	1/7J	Exploration Hémostase / Thrombophilie	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / respect de l'ordre des tubes	Non	4H à température ambiante strictement	J0 à J7	1020	200	/	/
Magnésium plasmatique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Magésium dans le plasma	SANG	Bleu de xylidyle C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0584	6	/	/
MDRD	Biochimie générale et spécialisée	Débit de filtration glomérulaire par détermination de la créatinine sanguine et calcul par application d'une équation intégrée	SANG	Calcul selon la formule du MDRD	2	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/
Méthémoglobine	Biochimie générale et spécialisée	Dosage de la méthémoglobine dans le sang	SANG TOTAL	Dosage sur par électrode spécifique sur les analyseurs de gaz du sang RP 500.	1	Seringue de gazométrie héparinée	24H/24H	Recherche d'un taux anormal de méthémoglobine	/	Gazométrie en artériel ou veineux	1.5 ml	1H	1H	0559	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Microfilaire (Recherche sur frottis sanguin)	Hématocytologie	Recherche et identification morphologique de microfilaires sur frottis sanguin et goutte épaisse.	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif par microscopie optique après coloration MGG.	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	7h - T. ambiante	J0 à J+3	1126	100	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Monomères de Fibrine (anciens Complexes Solubles)	Hémostase	Recherche de l'absence ou présence de Monomères de Fibrine dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	CIVD	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	8h - T. ambiante	J0	/	/	E152	8.10 euros
Morphologie des Hématies	Hématocytologie	Identification morphologique des hématies	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	/	/	/	/
Morphologie des leucocytes	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de leucocytes anormaux	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	/	/	/	/
Mycobactéries	Bactériologie	Recherche et numération de BAAR (Bacille acido-alcoolo résistant) Culture effectuée par un laboratoire extérieur	Tous types de prélèvements	Examen microscopique après coloration de Ziehl Culture effectuée par un laboratoire extérieur	N/A	Pot stérile sec	L.M.Me.J.V	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	Examen direct: 1-4J Culture(envoyée dans un laboratoire extérieur): 15j-2 mois	240	B30	/	/
Mycobacterium tuberculosis	Bactériologie	Recherche de M.tuberculosis et de la résistance à la Rifampicine par PCR	Broncho-pulmonaire non protégé	Biologie moléculaire	/	Pot stérile sec	7J/7	/	non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 3J T°ambiante - < 10J 2-8°C	< 24h	N131	135	/	/
Mycobacterium tuberculosis	Bactériologie	Recherche de M.tuberculosis et de la résistance à la Rifampicine par PCR	Broncho-pulmonaire protégé	Biologie moléculaire	/	Pot stérile sec	7J/7	/	non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 3J T°ambiante - < 10J 2-8°C	< 24h	N131	135	/	/
Mycoplasma Pneumoniae (sérologie) IgG +IgM	Sérologie infectieuse	Sérologie Mycoplasma pneumoniae IgG +IgM	SANG (SERUM)	CLIA Sandwich LIAISON XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	J4	/	/	/	/
Myélogramme	Hématocytologie	Examen cytologique : frottis d'appositions d'aspiration médullaire	MOELLE	Méthode manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif. Identification morphologique et numération sur frottis après coloration par microscopie optique	6 à 8 frottis médullaires	Trocart de Mallarmé à usage unique / Seringue / Lames	5/7 du lundi au vendredi	Oui	Oui	Non	Etalement de 6-8 frottis et fixation par séchage à l'air	T. ambiante ; délai d'acheminement < 24H après étalement	J0 à J+3	1101	250	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Nocardia	Bactériologie	Recherche spécifique Nocardia avec antibiogramme	Broncho-pulmonaire protégé	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse	N/A	Pot stérile sec	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 30J	214	B60	/	/
NT PRO BNP	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration du NT Pro BNP dans le sang	SANG	ECL/Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1821	64	/	/
Osmolalité sanguine	Biochimie générale et spécialisée	Mesure dans le sang du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant	SANG	Calcul	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	20	L125
Osmolalité urinaire	Biochimie générale et spécialisée	Mesure dans les urines du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant	URINES	Calcul	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	20	L125
Oxymétrie	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la saturation en oxygène du sang des artères coronaires par prélèvements artériels étagés	SANG TOTAL	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Seringue gazométrie	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1612	7	/	/
Oxyures	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification spécifique d'œufs d'oxyures. Examen non réalisé le week-end et jour férié.	Scotch Test	Examen direct microscopique	N/A	2 Rubans adhésifs transparents apposés sur une lame transparente	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Le patient doit se présenter au laboratoire le matin, avant toute toilette locale et avant l'émission de selles.	/	< 2h T°ambiante	< 24h	263 +9910	B10 + B10	/	/
Paludisme sur frottis-goutte épaisse (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et quantification de Plasmodium	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	du lundi au dimanche de 7H à 19H	Fièvre-voyage récent : pays endémique de séjour / date de retour / traitement antipaludique prophylactique ou curatif	Oui : feuille de renseignements cliniques "Recherche de Paludisme"	Non	> 1 mL	7h - T. ambiante	J0 (<4H après prélèvement)	1125	100	/	/
Panel Méningite	Bactériologie	principaux pathogènes responsables de méningite	Liquide de ponction	PCR qualitative en temps réel	N/A	Tube sec stérile (beige)	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	Le plus rapidement possible	< 8h	N156	/	/	1000

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
panel PCR Grippe A/B et VRS	Virologie	Recherche de gènes spécifiques des virus A et B de la grippe et du VRS (virus respiratoire syncytial)	ORL	Tech de biologie moléculaire RT PCR	1	1 écouvillon virocult ou AMIES	7j/7	sur demande des réanimateurs et infectiologues	non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 24h T° ambiante	< 12h	N131	/	/	RIHN 135
panel PCR Grippe A/B VRS COVID	Virologie	Recherche de gènes spécifiques des virus A et B de la grippe, du VRS (virus respiratoire syncytial) et du Sarscov2	ORL	Tech de biologie moléculaire RT PCR	1	1 écouvillon virocult	7j/7	uniquement pour la pédiatrie	non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 24h T° ambiante	< 12h	5272(grippe)+5271 (COVID)+N138 (VRS)	B60+B100+N138	/	/
Panel Pneumonie PCR multiplexe - Réservé réanimation	Bactériologie	Identification des principaux virus et bactéries impliqués dans les infections des voies respiratoires basses, ainsi que 7 marqueurs de résistance aux antibiotiques.	Broncho-pulmonaire protégé	PCR qualitatives et semi quantitatives	1 POT	Pot sterile	7J/7	Type et localisation	/	Cf Manuel de prélèvement	200 µL	<24h T°ambiante	1 H	N156	/	/	1000
Panel respiratoire	Bactériologie	Recherche de Virus: Adenovirus Coronavirus 229E Coronavirus HKU1 Coronavirus NL63 Coronavirus OC43 Coronavirus (MERS-CoV) Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Human Metapneumovirus Human Rhinovirus/Enterovirus Influenza A Influenza B Parainfluenza Virus 1 Parainfluenza Virus 2 Parainfluenza Virus 3 Parainfluenza Virus 4 Respiratory Syncytial	ORL	PCR qualitative en temps réel	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	6/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 4h T°ambiante	< 3J	N156	/	/	1000
Parasites dans sang (Recherche parasites sanguicoles sur frottis sanguin: Babesia,Microfilaires)	Hématocytologie	Recherche et identification morphologique de parasites sanguins (Babesia, Microfilaires) sur frottis sanguin et goutte épaisse.	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif par microscopie optique après coloration MGG.	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	7h - T. ambiante	J0 à J+3	1126	100	/	/
Parasitologie des selles	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de formes végétatives, kystes et œufs de parasites (hors recherche d'Anguillule)	Selles	Examen direct macroscopique et microscopique	N/A	Pot stérile sec	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Cf Manuel de prélèvement - Fiche info patient	/	< 12h T°ambiante ou < 24 h 2-8°C	< 4J	288	B145	/	/
Parathormone intacte (PTH)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Parathormone intacte dans le sang	SANG	ECL E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0983	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
PCR COVID	Virologie	Recherche de gènes spécifiques du SARS-CoV-2 par RT PCR	ORL / PULMONAIRE	RT PCR	N/A	1 écouvillon avec milieu de transport (virocult) OU pot stérile	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 24h T°ambiante	< 24h	5271	76	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
PCR COVID/grippe	Virologie	Recherche de gènes spécifiques du SARS-CoV-2 et influenzae A et B par RT PCR	ORL	RT PCR	N/A	1 écouvillon virocult	7/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 24h T°ambiante	< 4h	5271+5272	76+60	/	/
pH Urinaire	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la valeur du pH dans les urines	URINES	Siemens Multistix 8SG	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0630	7	/	/
Phosphatases alcalines plamatiques (PAL)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de l'activité enzymatique Phosphatase alcaline dans le sang	SANG	Colorimétrique C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0514	6	/	/
Phosphore (Phosphorémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Phosphore (Ph+) dans le sang	SANG	Phosphomolybdate/UV C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0563	6	/	/
Phosphore urinaire (Phosphaturie) (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Phosphore (Ph+) dans les urines	URINES	Phosphomolybdate/UV C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0629	15	/	/
Phtyrius inguinalis	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de Morpion	Cutané-phanère	Examen direct macro et/ou microscopique	N/A	Contacter le laboratoire	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Contacter le laboratoire	/	< 12h T°ambiante	< 4J	267+9910	B10+B10	/	/
Pityriasis versicolor	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de Malassezia furfur	Cutané-phanère	Examen microscopique	N/A	Contacter le laboratoire	L.M.Me.J.V	Localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement - Contacter le Laboratoire	/	< 24h T°ambiante	< 3 J	254	B150	/	/
Plaquettes sur citrate	Hématocytologie	Numération isolée des plaquettes sur prélèvement Citrate	SANG TOTAL	Méthode automatisée de type quantitatif par technique de cytométrie de flux	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Non	Non	Non	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	12h - T. ambiante	J0	1107	15	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Plaquettes sur EDTA	Hématocytologie	Numération isolée des plaquettes sur prélèvement EDTA	SANG TOTAL	Méthode automatisée de type quantitatif par technique d'impédancémétrie et/ou de cytométrie de flux	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0	1107	15	/	/
Plasmodium (Recherche) Tests antigèniques	Sérologie infectieuse	Recherche et identification (détection) d'antigènes spécifiques contre des agents infectieux de type Plasmodium	SANG TOTAL	Méthode immunologique de type qualitatif - Tests rapides sur supports solides par technique immunochromatographique	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Contexte clinique	Non	Non	Non	1h - T. ambiante	J0	4353	50	/	/
Plasmodium par test antigénique (recherche)	Hématocytologie	Recherche et identification (détection) d'antigènes spécifiques contre des agents infectieux de type plasmodium	Sang total	Méthode immunologique de type qualitatif - test rapide sur support solide par technique immunochromatographique	1	EDTA (tube mauve)	7/7	Contexte clinique à préciser	Non	Non	> 1 ml	7h à température ambiante	J0 <2H	/	/	G110	27 euros
POC Coqueluche	Bactériologie	Recherche de bactéries responsables de la Coqueluche ou syndrome coquelucheux (Bordetella pertussis, parapertussis, holmesii, bronchiseptica)	ORL	PCR qualitative en temps réel	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	6/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 3J	5258	140	/	/
POC HSV VZV / cutané	Virologie	Recherche de HSV1 HSV2 et VZV	LCR	PCR qualitative en temps réel	/	1 écouvilon avec milieu de transport	2/7	/	/	Cf manuel de prélèvement	/	< 48h	< 5j	4506 + 4507	B100+ B100	/	/
POC HSV VZV / LBA	Virologie	Recherche de HSV1 HSV2 et VZV	LBA	PCR qualitative en temps réel	/	Tube sec stérile (beige)	6/7	/	/	Cf manuel de prélèvement	/	< 2h	< 3 j	4506 + 4507	B100 + B100	/	/
POC Pneumopathie atypique	Bactériologie	Recherche de bactéries responsables de pneumopathie atypique : Mycoplasma pneumoniae, Legionella spp, Chlamydiae pneumoniae	ORL	PCR qualitative en temps réel	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	6/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 3J	N131	/	/	135
POC Streptocoque B	Bactériologie	PCR Stretocoque B	Génital femme	PCR	1	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	Strepto B non documenté à l'accouchement	/	Cf Manuel de prélèvement	/	< 24h T° ambiante - 6j 2-8°C	< 8h	0214	60	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Portage de Staph aureus	Bactériologie	Recherche de portage de Staphylococcus aureus en nasal et détermination de la sensibilité à l'Oxacilline	ORL	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé.	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	6/7	/	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 5J	0214	60	/	/
Potassium	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Potassium (K+) dans le sang	SANG	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1608	8	/	/
Potassium érythrocytaire	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Potassium (K+) dans les globules rouges	SANG TOTAL	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	25	L036
Potassium liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Potassium (K+) dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	15	L118
Potassium Urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Potassium (K+) dans les urines	URINES	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2006	8	/	/
Poux	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de Poux	Cutané-phanère	Examen direct macro et microscopique	N/A	Contacter le laboratoire	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Contacter le laboratoire	/	< 12h T°ambiante	< 4J	267+9910	B10+B10	/	/
Préalbumine	Biochimie générale et spécialisée	Dosage de la préalbumine dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie	1	Tube sec (rouge)	7j/7	/	/	/	1 ml	4h - T°C ambiante	J0	1817	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Préparation de sperme en vue d'Insémination Intra-Utérine (IIU)	Embryologie clinique	/	Sperme	Technique manuelle de préparation de sperme pour sélectionner une sous population de spermatozoïdes fécondants en vue de la réalisation d'une IIU	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Cf. Manuel de prélèvement AMP	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0059	200	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Préparation des spermatozoïdes obtenus chirurgicalement	Embryologie clinique	/	Prélèvement épididymaire ou biopsie testiculaire	Technique manuelle de préparation de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement en vue de leur utilisation en FIV ICSI +/- de leur autoconservation	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	/	0062	500	/	/
Procalcitonine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Procalcitonine dans le sang	SANG	ECL E8000 Roche	1	Tube Héparine Lithium (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7307	73	/	/
Profil lipidique	Biochimie générale et spécialisée	Aspect du plasma Dosage du cholestérol total Dosage des HDL Cholestérol Dosage des triglycérides Cholestérol LDL (Calcul selon formule de Friedewald)	Calcul mathématique	Enzymatique, colorimétrique C8000 Roche Calcul formule de Friedewald pour les LDL	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Prélever à jeun	Non	4h - T. ambiante	J0	0996	17	/	/
Progestérone sérique	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Progestérone dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Date des dernières règles/ stimulation ovarienne?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0334	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Prolactine	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Prolactine dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec rouge	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0343	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Protéine C activité	Hémostase	Détermination de la concentration de Protéine C activité dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	1/14J	Exploration de l'Hémostase/Thrombophilie/Thrombose	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0 à J14	0191	50	/	/
Protéine C-Réactive (CRP)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Protéine-C-Réactive dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie latex C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1804	8	/	/
Protéine C-Réactive capillaire (CRP capillaire) (EBMD)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration en Protéine-C-Réactive dans le sang par prélèvement capillaire	SANG TOTAL CAPILLAIRE	Enzymatique ABBOTT Afinion2	1	Capillaire intégré à la cassette de mesure	Fait à la demande du prescripteur par le personnel habilité du service	Non	Non	La ponction capillaire en Pédiatrie (3PED027)	Capillaire rempli	Réalisé immédiatement après prélèvement	Immédiat, réalisation de l'analyse en service	1804	8	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Protéine S activité	Hémostase	Détermination de la concentration de Protéine S activité dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	1/14J	Exploration de l'Hémostase/Thrombophilie/Thrombose	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H - T. ambiante	J0 à J14	0190	50	/	/
Protéine S libre antigène	Hémostase	Détermination de la concentration de Protéine S libre antigène dans le sang	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par immunoturbidimétrie	1	Tube citraté (bleu)	1/14J	Exploration de l'Hémostase/Thrombophilie/Thrombose	Non	Temps de pose dugarrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H - T. ambiante	J0 à J14	1025	50	/	/
Protéine S100 Bêta	BIOCHIMIE IMMUNOLOGIE	Dosage de la protéine S100.	SANG	ECL/Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7j/7	Traumatisme crânien léger	/	Dans les 3h suivant le traumatisme crânien	1 ml	12h avant centrifugation	1j	/	/	E042	https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/innovation-et-recherche/ribn
Protides (Protidémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Protéines totales dans le sang	SANG	Vert de bromocrésol C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2258	8	/	/
Protides sur LCR	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Protéines totales dans le LCR	LCR	Immuno turbidimétrie C8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1613	9	/	/
Protides sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Protéines totales dansun Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Vert de bromocrésol C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0691	9	/	/
Protides urinaires (Protéinurie) (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Protéines totales dans le urines	URINES	Vert de bromocrésol C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2004	6	/	/
PSA libre	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de PSA Libre dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Le toucher rectal, le massage prostatique, ou l'éjaculation n' entraînent pas d'élévation significative de la concentration du PSA. En revanche, la	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7320	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
PSA total	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de PSA total dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Le toucher rectal, le massage prostatique, ou l'éjaculation n' entraînent pas d'élévation significative de la concentration du PSA. En revanche, la réalisation d'une	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	7318	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Quantiféron	Biochimie générale et spécialisée	Détection de la production d'interféron gamma en présence d'antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis	SANG	CLIA sandwich Liaison XL DIASORIN	4	4 Tubes spécifiques Quantiféron (kit à demander au laboratoire)	2/7	La prise en charge est limitée aux situations suivantes: - Enfants migrants de moins de 15 ans provenant d'une zone de forte endémie tuberculeuse; - Patients infectés par le VIH (dépistage	/	Utilisez préalablement un tube de purge en cas d'utilisation de dispositif à ailettes. Le marquage noir situé sur le côté des tubes indique la plage de 0,8 à 1,2 ml du volume autorisé. Agitez	0.8 à 1.2 ml dans chaque tube	Avant incubation : 16h ; Incubation à 37°C 16 à 24h avant centrifugation et analyse	J4	4103	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Réchauffement embryonnaire	Cryobiologie	/	Embryon	Dévitrification embryonnaire et préparation du cathéter de transfert	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Réchauffement embryonnaire	Cryobiologie	/	Embryon	Dévitrification embryonnaire et préparation du cathéter en vue du transfert	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	/	/	C044	500
Recherche de BMR (BLSE-Carbapénèmase-VRE)	Bactériologie	Recherche de bactérie multi-résistante BLSE, VRE et carbapénèmase	Ecouvillon rectal	Culture sur milieux solides spécifiques / identification par Spectrométrie de masse / antibiogramme par diffusion sur milieu gélosé. Carbapénèmase : confirmation par biologie moléculaire.	/	1 écouvilon avec milieu de transport	7j/7	/	non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	214	B60	/	/
Réticulocytes	Hématocytologie	Numération des réticulocytes	SANG TOTAL	Méthode manuelle et/ou automatisée de type quantitatif par techniques de cytométrie de flux, immunofluorescence, calculs	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0	1109	19	/	/
Rotavirus/Adénovirus	Virologie	Recherche d'antigènes spécifiques de rotavirus et adénovirus	Selles	Test rapide immuno-chromatographique	1	Pot stérile	7/7	N/A	Non	Cf manuel de prélèvements	/	le plus rapidement possible à T°ambiante <3J 2-8°C	< 12h	4206+4267	B70+B70	/	/
Rougeole (sérologie) IgG +IgM	Sérologie infectieuse	Recherche d'infection récente sérologie Rougeole IgG + IgM	SANG (SERUM)	IgG : CLIA sandwich Liaison XL DIASORINIgM : CLIA Immunocapture Liaison XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	J4	1768	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Rubéole sérologie Anticorps IgG	Sérologie infectieuse	Détermination de la concentration d'Anticorps Anti-Rubéole de classe Ig.G dans le sang	SANG (SERUM)	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1773	36	/	/
Rubéole sérologie Anticorps IgM	Sérologie infectieuse	Dosage des anticorps anti-rubéolique de type IgM	SANG (SERUM)	CLIA immunocapture Liaison XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	J4	3783	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Sang dans les selles (Recherche)	Biochimie générale et spécialisée	Recherche de la présence de sang occulte dans les selles	SELLES	Immunochromatographie Standard Diagnostics	1	Pot non stérile	7/7	Non	Non	Ne pas prélever pendant les règles, en cas d'hémorroïdes présentant des saignements, en cas de présence de sang dans les urines ou de difficultés à aller à la selle	Non	3 jours T° ambiante / 7j entre 2 et 8°C	J1	1629	20	/	/
Sang dans les urines (Recherche)	Biochimie générale et spécialisée	Recherche de l'absence ou présence de Sang dans les urines	URINES	Siemens Hemastix	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0640	7	/	/
Sarcopte de la gale	Parasitologie-Mycologie	Recherche et identification de sarcoptes scabiei agent de la gale	Cutané-phanère	Examen direct macro et microscopique	N/A	Contacter le laboratoire	L.M.Me.J.V	N/A	Non	Contacter le laboratoire	/	< 12h T°ambiante	< 4J	267+9910	B10+B10	/	/
Saturation en O2 (artériel)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la saturation en oxygène du sang artériel	SANG TOTAL	Electrode spécifique RP500 Siemens	1	Seringue gazométrie	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1612	7	/	/
Schizocytes (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique et quantification de schizocytes	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	du lundi au samedi matin	Non	Non	Non	> 1 mL	12h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Sidérophiline - Coefficient de saturation	Biochimie générale et spécialisée	Calcul du rapport sanguin entre la concentration en fer (sidérémie) et la protéine porteuse du fer (sidérophiline)	SANG	Calcul C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	5/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2000	14	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Sidérophiline (Transferrine)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Sidérophiline (Transferrine) dans le sang	SANG	Immunoturbidimétrie C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1819	14	/	/
Sodium	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Sodium (Na+) dans le sang.	SANG	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L117
Sodium sur LCR	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Sodium (Na+) dans le LCR	LCR	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L117
Sodium sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Sodium (Na+) dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L117
Sodium urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Sodium (Na+) dans les urines	URINES	ISE indirecte C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	2005	7	/	/
Spermogramme - Spermocytogramme	Spermiologie diagnostique	Analyse de sperme éjaculé	Sperme	Technique manuelle ou semi-automatisée (SQA-Vision) d'analyse de la qualité d'un éjaculat à visée de reproduction	/	Réceptacle stérile adapté pour le recueil de sperme	/	Infertilité et suivi de spermatogenèse	Oui (distribuée par le secréatariat au moment de l'examen)	Désinfection mains et sexe avec betadine rouge puis jaune puis rinçage	/	2 à 7 jours d'abstinence. Température ambiante	4 à 7 jours	0070	110	/	/
Strepto B 37ième SA	Bactériologie	Recherche et identification spécifique de Streptocoque B	Génital femme	Culture sur milieux solides / identification par Spectrométrie de masse	N/A	1 écouvilon avec milieu de transport	7/7	grossesse	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	< 48h T°ambiante	< 7j	214	B60	/	/
Syphilis (tréponématose) : Anticorps totaux	Sérologie infectieuse	Dosage des anticorps anti-tréponème totaux dans le sang	SANG	ECL / Sandwich E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Suspicion de Syphilis	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J+3	1330	60	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Syphilis (tréponématose) : RPR	Sérologie infectieuse	/	SANG (SERUM)	Méthode manuelle semi-quantitative par agglutination	1	Tube sec (rouge)	2/7	Dépistage BW anticorps totaux positifs	/	/	1 ml	/	1j	/	/	/	/
T3 libre	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de T3 Libre dans le sang	SANG	ECL / Compétition E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Traitement?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	/	/
T4 libre	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de T4 Libre dans le sang	SANG	ECL / Compétition C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Traitement?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1207	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Taux de Prothrombine (TP)	Hémostase	Mode d'expression du Temps de coagulation d'un plasma sanguin citraté d'un patient en présence de thromboplastine calcique par rapport à un pool témoin	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique/Surveillance des traitements par AVK/Insuffisance hépatique	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H à température ambiante	J0	Sans AVK 0126 / Avec AVK 0127	16 / 20	/	/
Temps de Céphaline Activée (TCA - PTTA)	Hémostase	Temps de coagulation d'un plasma sanguin recalcifié en présence de céphaline (substitut plaquettaire) et d'un activateur soluble (acide ellagique).	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration Hémostase / Syndrome hémorragique / Surveillance traitements par HNF ou HBPM	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H à température ambiante strictement	J0	1127	16	/	/
Temps de Quick	Hémostase	Temps de coagulation d'un plasma sanguin citraté en présence de thromboplastine calcique	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique / Surveillance des traitements par AVK	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	24H à température ambiante	J0	0126	16	/	/
Temps de Thrombine (TT)	Hémostase	Temps de coagulation d'un plasma citraté lors de l'ajout d'une quantité connue de thrombine et de calcium.	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par chronométrie	1	Tube citraté (bleu)	1/14J	Vérifier l'absence d'HNF ou de Dabigatran (PRADAXA) dans le prélèvement.Détection des anomalies congénitales rares du fibrinogène.	Non	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	4H à T° ambiante	J0 à J14	/	/	E201	13.50 euros
Temps d'Occlusion Plaquettaire (TOP)	Hémostase	Temps d'occlusion plaquettaire en sang total sur une membrane en collagène avec adjonction d'épinéphrine ou d'ADP	SANG TOTAL	Méthode automatisée d'agrégation plaquettaire	2	Tube citraté (bleu)	7/7	Exploration de l'Hémostase/Syndrome hémorragique/Maladie de Willebrand/Surveillance des traitements par acide acétylsalicylique	Non	Eviter la période postprandiale/Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes/homogénéisation par 3-4 retournements lents	Remplissage jusqu'au trait en haut du tube	2H - T. ambiante	J0	/	/	E112	13.50 euros par agent agrégant

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
TEST	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Test à l'Hydrocortisone (HSHC)	Hématocytologie	Test de démargination des polynucléaires neutrophiles après administration d'Hydrocortisone	SANG TOTAL	Quantification manuelle et/ou automatisée des polynucléaires neutrophiles à T0, T2h et T4h (après administration d'HSHC)	1 tube mauve / temps donc 3 Tubes mauves avec les temps indiqués	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Non	Non	T0 et administration 100 mg HSHC en i/v. Puis T2h et T4h	> 1 mL pour chaque tube	12h- T. ambiante - A la fin du test : apporter au laboratoire les 3 tubes en même temps	J0 à J+3	1104 * 3	20 * 3	/	/
Test d'Addis Hamburger	Bactériologie	Mesure du débit/minute en hématies et leucocytes urinaire sur 3h.	URINE	Méthode de type qualitatif et quantitatif: Analyse d'images (URISED) ou lecture optique (manuelle, microscopie optique).	N/A	Pot stérile ou non stérile	7/7	Volume d'urine émis	Non	Cf Manuel de prélèvement	Cf Manuel de prélèvement	< 2h T°ambiante	< 24H	220	B25	/	/
Test de migration survie des spermatozoïdes (TMS)	Spermiologie diagnostique	Etude du sperme après capacitation	sperme	Technique manuelle ou semi-automatisée (SQA-Vision) d'analyse de la qualité d'un éjaculat après une sélection et capacitation par la technique appropriée	/	Réceptacle stérile adapté pour le recueil de sperme	/	Infertilité, pré-tentative d'AMP	Oui (distribuée par le secrétariat au moment de l'analyse)	Désinfection mains et sexe avec betadine rouge puis jaune puis rinçage	/	2 à 7 jours d'abstinence. Température ambiante	4 à 7 jours.	0075	120	/	/
Test de recherche d'anticorps fixés sur les spermatozoïdes (MAR-test)	Spermiologie diagnostique	Etude du sperme	Sperme éjaculé	Le MAR-test est un test de recherche directe d'anticorps anti-spermatozoïdes dans le sperme par réaction d'agglutination mixte utilisant des hématies humaines Rh positif revêtues d'IgG anti-Rh1.	/	Réceptacle stérile adapté pour le recueil de sperme	/	Infertilité, suspicion de traumatisme testiculaire	oui (distribué par le secrétariat au moment de l'analyse)	Désinfection mains et sexe avec betadine rouge puis jaune puis rincage	/	2 à 7 jours d'abstinence. Température ambiante	4 à 7 jours	0076	50	/	/
Test du vert d'Indocyanine	Biochimie générale et spécialisée	Test de clairance pour la détermination du débit sanguin hépatique et de la réserve fonctionnelle hépatique	SANG	Technique manuelle photométrique	1/temps	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	Respect impératif protocole de prélèvement et transport	Non	Réalisé immédiatement après prélèvement	J0	/	/	/	/
Testostérone Totale Homme	BIOCHIMIE IMMUNOLOGIE	Détermination de la concentration de testostérone totale.	SANG	ECL/Compétition E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7j/7	/	/	/	1 ml	24h avant centrifugation	1j	0357	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Thrombopénie induite par l'héparine (TIH)	Hémostase	Recherche d'Anticorps anti-Facteur 4 plaquettaire-polyanions (HNF, HBPM) de classe IgG	SANG (PLASMA)	Méthode manuelle qualitative par immunochromatographie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	thrombopénie sous héparine / thromboses veineuses ou artérielles sous héparine	oui	Temps de pose du garrot inférieur à 1 min / Respect ordre des tubes	Remplissage du tube jusqu'au trait	2H - T. ambiante	J0	1024	150	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Toxoplasmose (Sérologie) Ig.G + IgM	Sérologie infectieuse	Détermination de la concentration d'Anticorps Anti-Toxoplasme de classes Ig.G et IgM dans le sang.	SANG (SERUM)	IgG : ECL / Sandwich E8000 RocheIgM : ECL / µ-Capture E8000 Roche	1	Tube sec (rouge)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1420	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Tricholeucocytes (Recherche)	Hématocytologie	Identification morphologique : recherche et/ou quantification de tricholeucocytes	SANG TOTAL	Identification manuelle de type qualitatif et/ou quantitatif par microscopie optique	1	Tube EDTA (mauve)	5/7 du lundi au vendredi	Contexte clinique	Non	Non	> 1 mL	12 h - T. ambiante	J0 à J+3	1105	100	/	/
Triglycérides	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Triglycérides dans le sang	SANG	GK/GPO/PAP C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0590	8	/	/
Triglycérides sur Liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Triglycérides dans un Liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	GK/GPO/PAP C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L109
TRISOMIE 21 : 1er Trim	Biochimie générale et spécialisée	Dépistage intégré au premier trimèstre de la trisomie 21 fœtale par le dosage des marqueurs sériques maternel	SANG	Dosages sériques par Chimiluminescence (Cobas Roche): F-BHCG + PAPPA Calcul de risque dans le logiciel SSDW6	1	Tube SST jaune	3 séries par semaines (Lundi - Mercredi - Jeudi)	Fiche de renseignement + échographie	Fiche de rensignement obligatoire Attestation de consultation signée Consentement signé CR échographie du 1er trimestre	Création au laboratoire d'un dossier spécifique	1 ml	8h - T. ambiante	J+3	4006	Voir http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-	/	/
TRISOMIE 21 : 2ème Trim	Biochimie générale et spécialisée	Dépistage au second trimestre de la trisomie 21 fœtale par le dosage des marqueurs sériques maternel	SANG	Dosages sériques par chimiluminescence (Cobas Roche) : HCG totale + AFP Calcul de risque dans le logiciel SSDW6	1	Tube SST jaune	3 séries par semaine (Lundi-Mercredi - Jeudi)	Fiche de renseignement + échographie	Fiche de renseignement obligatoire Attestation de consultation signée Consentement signé CR échographie	Création au laboratoire d'un dossier spécifique	1 ml	4h - T. ambiante	J+3	4004	Voir http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-	/	/
Troponine T HS	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Troponine T hyper sensible dans le sang.	SANG	ECL / Sandwich C8000 Roche	1	Tube Héparine Lithium (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	2h - T. ambiante	120 min	7335	60	/	/
TSH ultra sensible	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de TSH ultra sensible dans le sang	SANG	ECL Sandwich E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Traitement?	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1208	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant a/lyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Urée (Azotémie)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Urée dans le sang	SANG	Uréase GLDH C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	0591	6	/	/
Urée sur liquide de ponction	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Urée dans un liquide de ponction	LIQUIDE DE PONCTION	Uréase GLDH C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L113
Urée urinaire (Dosage - Tx/l)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration d'Urée dans les urines	URINES	Uréase GLDH C8000 Roche	1	Tube sec stérile (beige) ou Pot stérile	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	/	/	10	L113
VANCOMYCINE Pic plasmatique	Pharmacologie - Toxicologie	Dosage du médicament Vancomycine dans le sang au pic d'injection.	SANG	KIMS C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Oui	Non	Non	2h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
VANCOMYCINE Taux résiduel	Pharmacologie - Toxicologie	Dosage résiduel du médicament Vancomycine dans le sang	SANG	KIMS C8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Oui	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1650	70	/	/
Vitamine B12	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la concentration de Vitamine B12 dans le sang	SANG	ECL /compétition E8000 Roche	1	Tube hépariné (vert)	7/7	Non	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	J0	1374	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Vitamine D (25-OH) (Hydroxycholécalciférol)	Biochimie générale et spécialisée	Détermination de la 25 OH vitamine D totale (forme de réserve) dans le sang	SANG	ECL/compétition	1	Tube sec (rouge)	7/7	Carence en Vitamine D ou Suivi thérapeutique	Non	Non	Non	4h - T. ambiante	1 J	1139	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Vitesse sédimentation (VS)	Hématocytologie	Vitesse de sédimentation des éléments figurés du sang	SANG TOTAL	Méthode manuelle et/ou automatisée de type quantitatif par mesure de la sédimentation en tube	1	Tube EDTA (mauve)	7/7	Non	Non	NON réalisable sur microtube EDTA	> 1 mL	6 h - T. ambiante	J0	1124	4	/	/

Examen	Famille	Nature de l'examen	Echantillon	Principe de la méthode / Equipement	Nombre échantillon	Matériel de prélèvement	Fréquence	Indications cliniques	Fiche de renseignement (info°)	Conditions spécifiques de prélèvement	Quantités requises	Délais et température avant analyse	Délai rendu résultat	Code BM	Valeur B	Code BHN	Valeur BHN
Vitrification d'ovocytes	Embryologie clinique	Cryobiologie	Ovocytes	Technique manuelle de cryobiologie ultra rapide pour la congélation des ovocytes en cours d'AMP ou en vue d'autoconservation	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Consentements	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	0084	1250	/	/
VRE Enterocoque résistant à la Vancomycine	Bactériologie	Recherche de VRE : bactérie hautement résistante émergente	Ecouvillon rectal	Recherche d'un gène de résistance à la Vancomycine par biologie moléculaire (GENEXPERT) : VAN A et VAN B.	1	1 écouvilon avec milieu de transport	7J/7	/	non	non	/	< 48h	< 4 JOURS	N131	135	/	/
VRS	Virologie	Recherche d'antigènes spécifiques du virus respiratoire syncytial (VRS)	ORL (écouvillon rhino-pharyngé, aspiration naso-pharyngée)	Test rapide immunochromatographique.	N/A	1 écouvillon virocult	7/7	Type et localisation	Non	Cf Manuel de prélèvement	/	écouvillon : <6H 2-30°C / aspiration : < 3h 2-30°C	4H	4247	B70	/	/
VZV (sérologie) IgG	Sérologie infectieuse	Détection d'anticorps de type IgG anti-VZV	SANG (SERUM)	CLIA sandwich Liaison XL DIASORIN	1	Tube sec (rouge)	2/7	/	/	/	1 ml	1j	J4	4507	http://www.codage.ext.cnamts.fr/cgi/nabm/cgi-fiche?	/	/
Xarelto- Activité anti-Xa (rivaroxaban)	Hémostase	Détermination de l'activité anti-Xa du Xarelto circulant dans le sang.	SANG (PLASMA)	Méthode automatisée quantitative par colorimétrie	1	Tube citraté (bleu)	7/7	Surveillance du traitement anticoagulant par XARELTO : Hémorragie ou risque hémorragique pré-opératoire	Non	Temps de pose du garrot < 1 min. / Respect de l'ordre des tubes	Remplissage du tube jusqu'au trait	2H- T. ambiante	J0	/	/	E154	16.20 euros